Observation

D'une Thum.r humorale tres Considerable Sur toute La Region hypogastrique, S'étendant Sur Les Laterallas droite & Gauche

un homme agé de 46. ans ou Environ, d'un temperament robuste, oiseleur de profession, occupé a tailler un arbre pour placer des gluaux, s'elevant avec effort pour faire la Sappe L'une branche, sentir Subitement une douleur tres aigue dans L'aine droite Le long des Vaisseaux Spermatiques Jusqu'au testicule; Il apperceut une thumeur molle a cette partie grosse comme une noix Croyant que La presence de quelque Intestin la faisoit naitre, La douleur augmentat par L'inquietude, Il prit le parti de se retirer Chez luy, Il se Couchat, quelques heures apres la douleur fut Calmée Sans aucun secours, Il s'endormit, & fut a son reveil agreablem.t Surprit que la thumeur etoit disparue totalement; Il ressentoit encore une Sensibilité mais tres Supportable, il prit toutes les postures Imaginables pour essayer si laditte thumeur reparoitroit, toutes Les attitudes furent Inutiles, rasseuré De son premier etat il allat Continuer sa pippée sans faire attention aux Consequences qui pourroient en resulter; Le quatrieme Jour les memes accidens reparurent de nouveau mais avec plus de Violence qui l'obligerent d'envoyer Chez Le Chirurgien proposé pour Le Domestique; qui trouvat ce malade

ARC 57
n° 117
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

avec des douleurs Egales a Celles que l'on Souffre dans une hernie avec Etranglement; ne remarquant ny tumeur ny Intemperie; ny aucune mauvaise Conformation; Il fit en Consequence de Cette douleur une Saignée Copieuse du bras, qui fut Suivie d'un Lavement fait avec une decoction Simple Emolliente, on appliqua le Cataplasme de mica Panis, le meme Soir La Saignée fut reiterée, Soutenue de La diette avec une boisson d'Eau panée, on remarqua que La peau etoit rouge par la Chaleur du Cataplasme, La douleur etoit mediocre, Sans fievre, Le matin du Cinquieme on apperceut une tumeur le long des vaisseaux Spermatiques Jusqu'au dessus de L'aine, telle qu'elle avoit parue La pre fois, qui augmenta Si Considerablement en moins de Six heures qu'elle occupoit depuis Cette partie designée Jusqu'a La Region de L'umbilic Scavoir toute L'hypogastre et Ses Regions Laterales.

Je prescrivis (dans mon Lit malade) au Chirurgien traitant la Conduite qu'il devoit tenir, (dans l'incertitude du Caractere de Cette maladie) en Consequence des accidens J'ordonnay, une troisieme Saignée, quatre heures apres un leger minoratif, une diette des plus Severes, le Cataplasme anodin fit place a un Emollient,* Le Septieme Jour Je vis Le malade Sans fievre, Sans douleur, & Sans aucune Inquietude relativement a son Etat. Je fus Surpris de voir une tumeur aussy Enorme occupant le bas ventre depuis deux doigts au dessous de L'umbilic, toute La Region hypogastrique gauche et droite tirant vers Cette partie avec une queue gagnant Le Le long des anneaux Jusque dans le Scrotum, Cette tumeur ayant la figure et la forme d'une ~~fumeuse~~ Cornemuse a demie Soufflée Comprimée par differentes mains, representant plusieurs tumeurs, qui me firent naitre L'idée d'une petite province herissée de montagnes dont quelqu'unes S'elevent plus que les autres, Je tatay tous les Coteaux et vallons, Je reconnus qu'ils avoient Communication; Je n'y remarquay aucune ~~Situ~~ Fluctuation Sensible, mais telle que l'on Sent dans une Enterocepiplocele avec un ressort a La peau, quoique Le vestige des doigts restat Imprimé ~~[illegible]~~, Je doutay du Caractere

* et resolutif

de Cette maladie; J'interrogay Le malade & Le Chirurgien, au recit desquels Je ne pus encore décider du genre de La Thumeur que Je n'avois pas vus naitre; Je fis Continuer Le Cataplasme Jusqu'au Lendemain que Je trouvay Le malade dans le meme Etat que la veille, a la reserve d'une Thumeur rouge & plus Elevée, Située au dessus de toutes Les autres, deux doigts plus bas que L'umbilic, avec une fluctuation Sensible, ce fut aussy celle la que Je Choisis pour L'ouverture en dissequant avec Le bistoury, La peau, la graisse et Les tegumens, a La faveur d'une Sonde Cannelée L'incision fut Continuée Jusqu'a L'aine, Il Sortit de ce prodigieu depot plus de trois Livres de pus d'une Couleur Verte et d'une puanteur Insupportable, m'etant asseuré que toutes les differentes monticules Se Communiquoient; Je fis donner deux Coups de Ciseaux a droite et a gauche pour rendre la premiere Incision Cruciale, et quoique La peau du Scrotum Se trouvat dissequée, Je ne permis point d'allonger L'ouverture plus basse que vers les anneaux tout etant affaissé par L'evacuation de La matiere, Le premier pencement Se fit a L'ordinaire en dilatant par tout Egalement, Les Suivans avec un digestif animé; mais ayant remarqué quelques Jours après L'operation, que les bords devenoient Calleux; fournissant une Supp^on. ichoreuse; cela me fit naitre le Soupçon d'une Cause Cachée; Je pris Le partie de La Combattre tant en forme de topiques, qu'interieurement avec les Specifiques administrés avec toute la prudence possible, au Cas que Cette methode n'ait pas un Succés heureux, une bonne Salivation terminerat tous Les Differens.

L'ouverture fut faite Le 3. 7bre après midy, Sans que depuis le malade ait gardé aucun Regime beuvant & mangant ce que Son appetit luy dictoit.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Suite

Considerant Cette tumeur en general, elle n'a rien de Singulier que l'on ne remarque presque dans toutes les autres de cette nature excepté sa grosseur et sa figure, mais l'examinant dans sa naissance, et dans les differens Symptomes qui ont variés, dans la Cause, et les parties qu'elle occupoit; je Crois qu'elle merite l'attention d'un praticien Lorsqu'il n'a pas été appellé en premier Instance, et qu'il doit Croire un malade occupé tout entier a la douleur, peu attentif a l'essentiel.

Cette tumeur qui parut d'abord aprés un mouvement forcé, et qui s'eclipsat dans le Cours de la nuit suivante, ne pouvoit-elle pas faire soubconner une hernie habituelle qui sort et rentre, quoiqu'aprés les Interrogations le malade soit sur la negative n'avouant que difficilem.t les sortes d'incommodités. Cette disparition subite doit donc faire reflechir Lorsque tout a Coup des memes accidens renaissent ensuite de mouvemens et d'actions forcés, et qu'en moins de six heures une tumeur augmente en hauteur et en largeur aussy Considerablement, sans aucun signe d'epenchement, quoique j'etois moralement persuadé qu'il y avoit du pus je ne pouvois assurer que cette tumeur fut entierement humorale pouvant s'y rencontrer des parties; dans cette Incertitude, je fis faire la premiere Incision en dissequant sur la tumeur la plus haute afin de pouvoir Continuer l'operation, que j'aurois dirigé a droite ou a gauche selon les Circonstances dans la Crainte d'ouvrir un Intestin auquel la moindre atteinte d'un Instrument trenchant peut Causer un mal sans remede; c'est donc une precaution que je Crois essentielle, toutes les fois que l'on est obligé de faire des ouvertures aux parois du bas ventre et Celle que j'observeray soigneusement

La peau du scrotum se reunit parfaitement bien ne fournissant rien dans l'appareil n'y par aucune Compression;

Legrand

1.er p.er chirurgien du prince charles de loraine

Bruxelles le 4 octobre 1750

No. VIII 58.